

Catálogo
de productos

Aniversario

57

1965 - 2022



Cosechando
**calidad
y experiencia**
para nutrir nuevas
generaciones

www.tridente.com.mx

Agroquímica
Tridente

COMPROMISO

Agroquímica Tridente S.A de C.V. tiene un gran compromiso con el medio ambiente, con el campo, con México, pero sobre todo con nuestros clientes.

MISIÓN

Producir, formular, distribuir y comercializar productos de excelente calidad para la protección de cultivos, la seguridad alimentaria y el cuidado de la salud.

VISIÓN

Ser líder en soluciones de productos fitosanitarios y de salud ambiental con el esfuerzo y experiencia de nuestro equipo de trabajo, en beneficio de la sociedad y campo mexicano.

EMPRESA

Formulación y distribución de productos químicos para la protección de cultivos y control de plagas urbanas.





Agroquímica
Tridente
S.A. de C.V.

Agroquímica Tridente es una empresa
100% mexicana con más de 56 años
ganando experiencia y solidez para brindar
CALIDAD a través de nuestros productos.

Tridente



Nuestra cartera de productos
en línea agrícola esta integrada por
un amplio número de ingredientes activos
que componen diferentes productos formu-
lados para la protección de cultivos.

Nuestro lema es “*Calidad Tridente*” ya que
buscamos satisfacer las necesidades de
nuestros clientes ofreciéndoles productos de
alta calidad. Por ello seguimos trabajando por
mejorar nuestros productos, ofreciéndoles un
extenso catálogo, así como nuevos productos,
mejores fórmulas, servicio y herramientas para
cubrir sus necesidades.

3

VALORES

- Calidad
- Honestidad
- Respeto
- Servicio
- Responsabilidad





Contamos con nuestros representantes de desarrollo comercial y gerentes de territorio con presencia en toda la República Mexicana. Nos encontramos siempre cerca con una amplia red de distribuidores autorizados Tridente.

Así como asesoría técnica y recomendaciones para la elección del método ideal.



4

Actualmente nuestro catálogo de productos comprende el uso de más de 50 moléculas diferentes las cuales se formulan más de 130 productos terminados como concentrados emulsionables, suspensiones acuosas, polvos humectables, granulados y polvos.



**Agroquímica
Tridente**
S.A. de C.V.



1 I.A: Benomilo 50% equivalente a 500g de I.A./Kg.

2 **Cultivos:** Aguacate, almendro, apio, arroz, bulbos ornamentales, cacahuate, calabaza, ciruelo, durazno, fresa, frijol, jitomate, limonero, mango, manzano, melón, naranjo, pepino, peral, plátano, rosál, soya, toronja, vid.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida agrícola sistémico y de contacto | Polvo humectable. RSCO-FUNG-0303-314-002-050. **Categoría toxicológica:** 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

4 **Presentaciones:** .100 Kg .250 Kg .500 Kg **Dosis:** árboles frutales: 40-90 g / 100 L de agua. hortalizas: 250-600 g / ha



1 I.A: Captan 50% equivalente a 500g de I.A./Kg

2 **Cultivos:** Berenjena, calabacita, cebolla, chile, fresa, jitomate, mango, manzano, melón, pepino, sandía, ornamentales, peral, vid y zanahoria.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida | Polvo humectable. RSCO-FUNG-0306-X088-002-050. **Categoría toxicológica:** 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

4 **Presentación:** 1 Kg **Dosis:** 3 Kg / ha



1 I.A: Tiofanato metílico 70% equivalente a 700g de I.A./Kg

2 **Cultivos:** Apio, calabacita, cebolla, chabacano, ciruelo, durazno, fresa, frijol, jitomate, manzano, melón, nectarino, papa, pepino, plátano, sandía, trigo.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida agrícola de triple acción: sistémico, preventivo y curativo. | Polvo humectable RSCO-FUNG-0369-X0192-417-70.0 **Categoría toxicológica:** 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

4 **Presentaciones:** .200 Kg. 1 Kg. **Dosis:** .5 a 1.0 Kg / ha



1 I.A: Clorotalonil 54% equivalente a 720g de I.A./L

2 **Cultivos:** Ajo, apio, brócoli, cacahuate, cacao, café, calabacita, calabaza, cebolla, cebolla verde, campesúchil, césped, chabacano, chile, ciruelo, col, col de brúselas, coliflor, crisantemo, durazno, frijol, frijol ejotero, geranio, jitomate, maíz, mango, melón, nectarino, ornamentales, papa, papayo, pepino, plátano, rosál, sandía, soya, tomate de cáscara, zanahoria.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida agrícola recomendado para la prevención y control de las enfermedades | Suspensión acuosa RSCO-FUNG-0309-X0174-008-54.0 **Categoría toxicológica:** 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

4 **Presentaciones:** .950 L 20 L 5 L **Dosis:** .9 - 4 L / ha

1 I.A: **Folpet 80% equivalente a 800g de I.A./Kg**

2 **Cultivos:** Aguacatero, berenjena, cebolla, chile, fresa, jitomate, lechuga, limonero, manzano, melón, naranjo, ornamentales, papa, pepino, tomate con cáscara, toronjo, vid.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida agrícola de contacto | Gránulos dispersables. | RSCO-FUNG-0318-312-034-080.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo por el contacto con la piel.*

4 **Presentación:** 1 Kg
Dosis: 1 – 3 Kg / ha
Ornamentales: 200g /100 L de agua



1 I.A: **Fosetil - Aluminio 80% equivalente a 800g de I.A./Kg**

2 **Cultivos:** Piña

3 **Formulación y Registro:** Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa | Gránulos dispersables.
RSCO-FUNG-0347-X0177-034-80.0
Categoría toxicológica: 5 PRECAUCIÓN. *Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo por el contacto con la piel, puede ser nocivo si se inhala.*

4 **Presentación:** 1 Kg
Dosis: 200-250 g / 100 L




6

1 I.A: **Metalaxil 9% equivalente a 90g de I.A./Kg + Clorotalonil 72% equivalente a 720g de I.A./Kg**

2 **Cultivos:** Calabacita, calabaza, jitomate, melón, papa, pepino, sandía.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida sistémico y de contacto | Polvo humectable | RSCO-MEZZ-1311-307-002-081.
Categoría toxicológica: 5 PRECAUCIÓN. *Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo por el contacto con la piel, puede ser nocivo si se inhala.*

4 **Presentaciones:** .500 Kg
1 Kg
Dosis: 3.5 Kg / ha



1 I.A: **Carbendazim 50% equivalente a 500g de I.A./Kg**

2 **Cultivos:** Rosal.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida sistémico | Polvo humectable | RSCO-FUNG-0307-326-002-050.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

4 **Presentaciones:** .100 Kg
.250 Kg
1 Kg
Dosis: 75-100g / 10L de agua





1 I.A: Carbendazim 43% equivalente a 492.35g de I.A./L

2 Cultivos: Frijol, soya.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida agrícola | Suspensión acuosa RSCO-FUNG-0307-336-008-043.

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo por el contacto con la piel, nocivo si se inhala.*

1 Presentaciones:	Dosis:
.240 L	400 - 500ml / 100L agua / ha
1 L	



1 I.A: Clorotalonil 75% equivalente a 750g de I.A./Kg

2 **Cultivos:** Ajo, apio, brócoli, cacahuete, calabaza, cebolla, cempasúchil, col de bruselas, coliflor, crisantemo, durazno, frijol, frijol ejotero, jitomate, melón, papa, papayo, pepino, plátano, rosál, sandía, soya, tomate de cáscara, zanahoria.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida agrícola que actúa por contacto en la prevención y control de enfermedades | Polvo humectable | RSCO-FUNG-0309-398-002-075.

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

1 Presentación:	Dosis:
1 Kg	1.5 - 3Kg / ha



1 I.A: Mancozeb 80% equivalente a 800g de I.A./Kg

2 **Cultivos:** Algodón, apio, avena, cacahuete, calabacita, cebada, cebolla, espárrago, jitomate, maíz, manzano, melón, ornamentales, papa, papayo, pepino, peral, plátano, tabaco, trigo, vid.

3 **Formulación y Registro:** Fungicida agrícola que actúa en prevención y control de enfermedades | Polvo humectable | RSCO-FUNG-0322-367-002-080.

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

1 Presentación:	Dosis:
1 Kg	1.5 - 3 Kg / ha
	Árboles frutales: 200-400g / 100L agua



1 I.A: Sal dimetilamina del ácido 2,4-d

2 **Cultivos:** Maíz, sorgo.

3 **Formulación y Registro:** Herbicida agrícola hormonal selectivo de post-emergencia y acción por contacto | Solución acuosa RSCO-HEDE-0222-0308-014-49.90

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión.*

1 Presentaciones:	Dosis:
.950 L	5 L
10 L	20 L
	1.0 - 2.0 L / ha

- I.A: Atrazina 45% equivalente a 500g de I.A./L**
- Cultivos:** Maíz, sorgo.
- Formulación y Registro:** Herbicida agrícola selectivo.
| Suspensión concentrada. | RSCO-HEDE-0204-258-064-45.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*
- Presentación:** 1 L **Dosis:** 2 - 4 L / ha



- I.A: Atrazina 90% equivalente a 900g de I.A./Kg.**
- Cultivos:** Maíz y sorgo.
- Formulación y Registro:** Herbicida agrícola de acción sistémica selectivo | Gránulos dispersables.
RSCO-HEDE-0204-0486-034-90.0.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*
- Presentación:** 1 Kg **Dosis:** 1-2 Kg / ha



8

- I.A: ametrina + 2,4-d éster isobutílico equivalente a 255 g de I.A./L.**
- Cultivos:** Caña de azúcar.
- Formulación y Registro:** Herbicida agrícola selectivo.
| Concentrado emulsionable.
RSCO-MEZC-HEDE 1206-X0007-009-41.9.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo si se inhala.*
- Presentaciones:** 1 L **Dosis:** 4.0 - 6.0 L / ha
5 L



- I.A: Paraquat 25% equivalente a 200g de I.A./L**
- Cultivos:** Aguacate, alfalfa, algodón, avena, brócoli, café, calabacita, caña de azúcar, cártamo, cebada, cebolla, chícharo, col, coliflor, durazno, espárrago, frijol, girasol, guayabo, jitomate, lechuga, lima, limonero, maíz, mandarino, manzano, melón, naranjo, nogal, papa, papaya, pepino, peral, piña, plátano, sandía, sorgo, soya, toronjo, trigo, zanahoria.
- Formulación y Registro:** Herbicida agrícola desecante de contacto no selectivo y post-emergente | Suspensión acuosa
RSCO-HEDE-0244-0500-008-25.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo si se inhala.*
- Presentaciones:** .900 L **Dosis:** 1.75 - 3.0 L / ha
10 L 20 L





1 I.A: Paraquat 56.57% Equivalente a 200 g / L de ion bipiridilo ó 280.40 g / L de dicloruro de paraquat + Diuron 9.2% Equivalente a 100 g / L.

2 Cultivos: Maíz y sorgo.

3 Formulación y Registro: Herbicida desecante agrícola de contacto no selectivo y aplicación post-emergente | Suspensión concentrada RSCO-MEJC-1229-0609-064-65.77.

Categoría toxicológica: 1 PELIGRO. Mortal si se inhala.

Presentaciones:	Dosis:
.900 L	5 L
10 L	20 L
	2.0 - 3.0 L / ha



1 I.A: 2-4 D 49.64% equivalente a 400g de I.A./L

2 Cultivos: Arroz, avena, cebada, centeno, trigo, maíz, sorgo, pastizales, potreros, caña de azúcar.

3 Formulación y Registro: Herbicida agrícola selectivo post-emergente. | Concentrado emulsionable. RSCO-HEDE-0222-017-009-050

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo en caso de ingestión, nocivo si se inhala.

Presentaciones:	Dosis:
.950 L	.6 - 3.0 L / ha
5 L	



1 I.A: Fomesafen 22.50 % Equivalente a 250 g de I.A. / L a 20 °C

2 Cultivos: Frijol, soya.

3 Formulación y Registro: Herbicida de contacto selectivo, para el control post-emergente | Concentrado emulsionable. RSCO-HEDE-0263-X0253-009-22.50

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo en caso de ingestión, nocivo si se inhala.

Presentaciones:	Dosis:
1 L	.5 - 1.0 L / ha
5 L	



1 I.A: Glufosinato de amonio 18.4% equivalente a 200 g de I.A./L

2 Cultivos: Agave, aguacatero, cidro, lima, limón, maíz, mandarina, naranja, pomelo, sorgo, tangerino, toronja.

3 Formulación y Registro: Herbicida de contacto no selectivo para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas y zacates en post emergencia. | Concentrado soluble. RSCO-HEDE-0231-X0107-375-18.40.

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo si se inhala.

Presentaciones:	Dosis:
.950 L	1.125 - 3.0 L / ha
5 L	

- 1** I.A: Oxifluorfen 13% equivalente a 240 g de I.A./L
- 2** **Cultivos:** Ajo, cebolla, cafeto, plátano, nogal, vid, algodónero, almendro, ciruelo, durazno, manzano, peral, brocoli, col, coliflor, lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo, soya.
- 3** **Formulación y Registro:** Herbicida pre-emergente y post-emergente que actúa de contacto. | Concentrado emulsionable. | REG.RSCO-HEDE-0243-X0268-009-24.20
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*
- 1** **Presentación:** 1 L **Dosis:** .1 - 4 L / ha



- 1** I.A: Clethodime 13% equivalente a 120 g de I.A./L
- 2** **Cultivos:** Agave, forrajes de alfalfa, forrajes de trébol, algodónero, berenjena, calabacita, calabaza, cebolla, poro, cebollín, espárragos, chile, jitomate, melón, okra, papa, pepino, pimiento morrón, sandía, tomate de cáscara.
- 3** **Formulación y Registro:** Herbicida sistémico post-emergente y selectivo de amplio espectro, actúa por contacto y traslocación en maleza anuales y perennes. | Concentrado emulsionable. REG. RSCO-HEDE-0270-310-009-013.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*
- 1** **Presentación:** .500 L **Dosis:** .60 - 1.5 L / ha



10

- 1** I.A: Diurón 80% equivalente a 800g de I.A./Kg
- 2** **Cultivos:** Vid.
- 3** **Formulación y Registro:** Herbicida agrícola selectivo post-emergente. | Granulos Dispersables. RSCO-HEDE-0221-0515-0424-80
Categoría toxicológica: 5 PRECAUCIÓN. *Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo por el contacto con la piel, puede ser nocivo si se inhala.*
- 1** **Presentación:** 1 Kg **Dosis:** 1.5 - 4.0 Kg / ha



- 1** I.A: Diurón 53.3% + Hexazinona 6.7% equivalente a 533g de I.A./Kg y 67g de I.A./Kg respectivamente.
- 2** **Cultivos:** Caña de azúcar.
- 3** **Formulación y Registro:** Herbicida agrícola post-emergente. | Gránulos dispersables | RSCO-MEZZ-1222-0668-343-60.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*
- 1** **Presentación:** 1Kg **Dosis:** 2.0 - 4.0 Kg / ha





1 I.A: 2,4-D 20.58% + Picloram 5.49%
equivalente a 240 g y 64 g de I.A./L respectivamente.

2 Cultivos: Pastizal establecido en potreros.

3 **Formulación y Registro:** Herbicida agrícola selectivo y sistémico.
| Concentrado Soluble. | RSCO-MEZC-1219-0669-375-26.07.
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo si se inhala.

4 **Presentaciones:** Dosis:
1 L 2.0 - 4.0 L / ha
5 L
10 L



1 **PRESTIGIO:** Benzoato de emamectina 1.79 % equivalente a 19 g/L
CIALOTRIN: Lambda cyhalotrina 5.60% equivalente a 50 g. de I.A./L

2 **Cultivo:** Maíz.

3 **Formulación y Registro:** Insecticidas de amplio espectro.
| Concentrado emulsionable.
PRESTIGIO: RSCO-INAC-0102M-X0269-009-1.79
CIALOTRIN: RSCO-INAC-0177-X0088-009-5.60
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo en caso de ingestión y nocivo si se inhala.

4 **Presentaciones:**
100 ml PRESTIGIO + 240 ml de CIALOTRIN 5 CE



1 I.A: Clorpirifos etil, equivalente a 475 g de I.A./L

2 **Cultivos:** Caña de azúcar, alfalfa, algodónero, arroz, lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo, chile, frijol ejotero, garbanzo, jitomate, maíz, manzano, pepino, sorgo, soya, trigo.

3 **Formulación y Registro:** Insecticida de contacto, ingestión e inhalación. | Concentrado emulsionable.
| RSCO-INAC-0115-X0413-009-44.50
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo por el contacto con la piel. Nocivo si se inhala.

4 **Presentaciones:** Dosis:
.240 L .5 - 2 L / ha
.450 L
.950 L
5 L



1 I.A: Clorpirifos, equivalente a 50g de I.A./Kg

2 **Cultivos:** Maíz, sorgo.

3 **Formulación y Registro:** Insecticida de contacto e ingestión para el control de plagas de suelo. | Granulado.
| RSCO-INAC-0115-X0426-369-5.00
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo en caso de ingestión. Nocivo si se inhala.

4 **Presentaciones:** Dosis:
5 Kg 15 - 30 Kg / ha
20 Kg

Herbicidas

Insecticidas

11

1 I.A: Clorpirifos Etil 33.80% + Permetrina 4.80% equivalente a 350g y 50g de I.A./L respectivamente.

2 Cultivos: Jitomate, soya, maíz, chile, algodón.

3 Formulación y Registro: Insecticida agrícola de contacto.
| Concentrado emulsionable.
RSCO-MEJC-INAC-1105-X0030-009-38.6

Categoría toxicológica: 3 PELIGRO. Tóxico en caso de ingestión y tóxico si se inhala.

4 Presentaciones: Dosis:
.240 L .75 - 2 L / ha
.950 L



1 I.A: Clorpirifos 3% equivalente a 30g de I.A./Kg

2 Cultivos: Arroz, avena, cebada, centeno, maíz, pastizales establecidos en potreros, sorgo, trigo.

3 Formulación y Registro: Insecticida agrícola que actúa por contacto e ingestión | Polvo | RSCO-INAC-0115-X0296-01-3.0
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo en caso de ingestión y nocivo si se inhala.

4 Presentaciones: Dosis:
1 Kg 15 - 20 Kg / ha
20 Kg Pastizales 25 - 45 Kg / ha



12

1 I.A: Malation 4% equivalente a 40g de I.A./Kg

2 Cultivos: Granos y semillas almacenadas de: Arroz, avena, cebada, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, soya, trigo.

3 Formulación y Registro: Insecticida-acaricida de uso agrícola que actúa por contacto e ingestión | Polvo
RSCO-INAC-0143-137-001-004
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo si se inhala.

4 Presentaciones: Dosis:
1 Kg 1 - 1.5 Kg / Tonelada de grano
20 Kg



1 I.A: Lambda cyhalotrina 5.60% equivalente a 50 g. de I.A./L

2 Cultivos: Maíz.

3 Formulación y Registro: Insecticida piretroide de muy amplio espectro que actúa por ingestión y contacto | Concentrado emulsionable | RSCO-INAC-0177-X0088-009-5.60
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. Nocivo en caso de ingestión y nocivo si se inhala.

4 Presentaciones: Dosis:
.240 L .3 - .5 L / ha
1 L





I.A: Terbufos 5% equivalente a 50g de I.A./Kg

Cultivos: Maíz, sorgo.

Formulación y Registro: Insecticida agrícola | Nematicida sistémico | Granulado-hojuela. | RSCO-INAC-0163-326-005-005
Categoría toxicológica: 2 PELIGRO. *Mortal en caso de ingestión, mortal por el contacto con la piel, mortal si se inhala.*

Presentaciones:	Dosis:
5 Kg	20 - 25 Kg / ha
20 Kg	



I.A: Diclorvos 47.5% equivalente a 500g de I.A./L

Cultivos: Granos almacenados de maíz en silos o granel. Estibas de grano de maíz ensacado

Formulación y Registro: Insecticida y/o acaricida | Concentrado emulsionable | RSCO-INAC-0121-006-009-047
Categoría toxicológica: 2 PELIGRO. *Mortal por el contacto con la piel.*

Presentaciones:	Dosis:
.950 L	.250 - 2.5 L / 100 L de agua
5 L	



I.A: Bifentrina 12.15% equivalente a 109.60 g de I. A.

Cultivos: Algodonero, berenjena, brócoli, calabacita, calabaza, chayote, chícharo, chile, col, col de bruselas, coliflor, frambuesa, fresa, frijol, frijol ejotero, haba, jitomate, lechuga, lima, limonero, mandarina, melón, naranjo, papa, pepino, rosal, sandía, tabaco, tomate de cáscara, toronjo, zarzamora.

Formulación y Registro: Insecticida agrícola piretroide que actúa por contacto e ingestión. | Concentrado emulsionable. RSCO-INAC-0176-X0102-009-12.15
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión y nocivo si se inhala.*

Presentaciones:	Dosis:
.240 L	.5 - 1 L / ha
.950 L	



I.A: Diazinón 4% equivalente a 40g de I.A./Kg

Cultivos: Brócoli, cacahuete, calabacita, caña de azúcar, cebolla, césped, chícharo, chile, col, coliflor, durazno, frijol, jitomate, limonero, maíz, manzano, melón, naranjo, papa, pepino, peral, plátano, sandía, sorgo, soya.

Formulación y Registro: Insecticida agrícola. | Granulado de contacto. | RSCO-INAC-0120-424-005-004
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión y nocivo si se inhala. Nocivo por el contacto con la piel.*

Presentaciones:	Dosis:	
2 Kg	5 Kg	15 - 50 Kg / ha
10 Kg	20 Kg	Hormiga: 30 g
25 Kg		

13



- I.A: Imidacloprid 30.20% equivalente a 350g de I.A./Kg**
- Cultivos:** Aguacate, arroz, avena, cebada, cidro, lima, limón, maíz, mandarina, naranja, pomelo, sorgo, toronja, trigo.
- Formulación y Registro:** Insecticida agrícola de amplio espectro | Suspensión Concentrada | RSCO-INAC-0199-X0231-064-30.2
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*
- Presentaciones:** Dosis:
.200 L 200 - 300 ml / ha
1 L Aguacatero: 300 - 600 ml / ha
En cítricos: 30 - 40 ml / 100 L de agua



- I.A: Imidacloprid 29% + Fipronil 8.30 % equivalente a 350 g y 100 g de I.A./L**
- Cultivos:** Ajo, berenjena, cebolla, chile, jitomate, papa, pimienta morrón, poro, tomate verde.
- Formulación y Registro:** Mezcla de insecticidas que actúa por contacto e ingestión. | Suspensión concentrada.
RSCO-MEZZ-INAC-1150-X035-064-37.3
Categoría toxicológica: 2 PELIGRO. *Mortal si se inhala.*
- Presentaciones:** Dosis:
.240 L .75 - 1.25 L / ha
1 L



14

- I.A: Fosfuro de aluminio 56% equivalente a 560g de I.A./Kg**
- Cultivos:** Granos y semillas almacenadas de: Arroz, avena, cebada, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, soya, trigo.
- Formulación y Registro:** Fumigante agrícola para el control de plagas en granos almacenados | Tabletas
RSCO-FUMI-0407-316-006-056
Categoría toxicológica: 1 PELIGRO. *Mortal en caso de ingestión y mortal si se inhala.*
- Presentaciones:** Dosis:
.960 Kg 2 a 4 pastillas por m³
1.5 Kg Menor tiempo de fumigación 72 h



- I.A: Fosfuro de aluminio 56% equivalente a 560g de I.A./Kg**
- Cultivos:** Granos almacenados de maíz en silos o granel. Estibas de grano de maíz ensacado.
- Formulación y Registro:** Fumigante agrícola para el control de plagas en granos almacenados | Tabletas
RSCO-FUMI-0407-320-095-056
Categoría toxicológica: 1 PELIGRO. *Mortal en caso de ingestión y mortal si se inhala.*
- Presentación:** Dosis:
1.5 Kg 2 a 6 pastillas por m³





1 I.A: Diazinón 25% equivalente a 230g de I.A./L

2 Cultivos: Alfalfa, cacahuete, calabaza, cebolla, chícharo, chile, ciruelo, durazno, fresa, frijol, jitomate, manzano, melón, pepino, sandía, soya.

3 Formulación y Registro: Insecticida y/o acaricida.
| Concentrado emulsionable | RSCO-INAC-0120-007-009-025
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo por el contacto con la piel, nocivo si se inhala.*

Presentaciones:	Dosis:
.240 L .950 L	1 - 1.5 L / ha
5 L	Fresa: 4 - 5 L / ha



1 I.A: Diazinón 57.97% equivalente a 600g de I.A./Kg

2 Cultivos: Chile, jitomate

3 Formulación y Registro: Insecticida agrícola que actúa por contacto e ingestión.
| Concentrado emulsionable | RSCO-INAC-0120-392-009-058
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión y nocivo si se inhala.*

Presentaciones:	Dosis:
.950 L	.3 - .75 L / ha
5 L	

15



1 I.A: Abamectina 1.8% equivalente a 18g de I.A./L

2 Cultivos: Calabacita, chile, cidro, cítricos, crisantemo, fresa, jitomate, lima, limón, mandarina, melón, naranja, papa, pepino, pomelo, sandía, tangerino, toronja.

3 Formulación y Registro: Insecticida-acaricida
| Concentrado emulsionable. | RSCO-INAC-0174-356-009-002
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo por el contacto con la piel, nocivo si se inhala.*

Presentaciones:	Dosis:
.240 L 1 L	80 - 100 ml / 100 L de agua
5 L	



1 I.A: Malatión 48.6% equivalente a 500g de I.A./L

2 Cultivos: Aguacatero, arroz, berenjena, calabaza, cebolla, chile, durazno, frijol, lima, limonero, maíz, mango, melón, naranja, papayo, pepino, sorgo, trigo.

3 Formulación y Registro: Insecticida organofosforado.
| Concentrado emulsionable. | RSCO-INAC-0143-024-009-049
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

Presentaciones:	Dosis:
.240 L .450 L	1 - 3 L / ha
.950 L 5 L	



1 I.A: Malation 83.6% equivalente a 1000g de I.A./L

2 **Cultivos:** Agave, aguacatero, Ajo, alfalfa, algodónero, arándano, arroz, avena, berenjena, brócoli, calabacita, calabaza, cártamo, cebada, cebolla, chabacano, chícharo, chile, col, col de bruselas, coliflor, durazno, frambuesa, fresa, frijol, guayabo, jitomate, lechuga, lima, limonero, maíz, mango, manzano, melón, membrillo, naranjo, nogal pecanero, papa, papayo, pastizales, pepino, peral, piña, sandía, sorgo, tangerino, tomate de cáscara, toronjo, trigo, vid, zarzamora.

3 **Formulación y Registro:** Insecticida organofosforado.
| Concentrado emulsionable | RSCO-INAC-0143-025-009-084
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*

4 **Presentaciones:** **Dosis:**
.450 L .950 L .5 - 2 L / ha
5 L Frutales: 125 - 200 ml / 100 L de agua

5 I.A: Permetrina 34% equivalente a 340g de I.A./L

6 **Cultivos:** Aguacatero, apio, berenjena, brócoli, calabaza, chile bell, col, col de bruselas, coliflor, durazno, espárragos, espinaca, jitomate, lechuga, maíz, manzano, melón, papa, pastos, pepino, peral, sandía, soya, tabaco.

7 **Formulación y Registro:** Insecticida acaricida piretroide de acción por contacto e ingestión. | Concentrado emulsionable.
RSCO-INAC-0156-333-009-034
Categoría toxicológica: 3 PELIGRO. *Tóxico si se inhala.*

8 **Presentaciones:** **Dosis:**
.240 L .2 - .8 L / ha
.950 L Frutales: 150 - 200 ml / 100 L de agua

16

9 I.A: Imidacloprid 18.8% + Lambda Cyalotrina 9% equivalente a 214.1 g y 102.5 g de I.A./L

10 **Cultivos:** Jitomate, berenjena, chile, tomate verde, okra, papa, pimiento morrón, naranja, cidro, lima, limón, mandarina, pomelo, tangerino, toronja, chile, berenjena, aguacate.

11 **Formulación y Registro:** Insecticida | Suspensión concentrada.
RSCO-MEZZ-INAC-1101H-X0008-014-27.8
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala, nocivo en caso de ingestión*

12 **Presentaciones:** **Dosis:**
.250 L .500 L Cítricos y aguacate 200-300 ml/ ha
1 L Hortalizas 300 - 350 ml/ ha

13 I.A: Metamidofos 48% equivalente a 600g de I.A./L

14 **Cultivos:** Algodonero, brócoli, chile, col, col de bruselas, coliflor, jitomate, lechuga, melón, papa, pepino, sandía.

15 **Formulación y Registro:** Insecticida y acaricida fosforado
| Líquido miscible | RSCO-INAC-0144-302-012-048
Categoría toxicológica: 2 PELIGRO. *Mortal en caso de ingestión, mortal por el contacto con la piel, mortal si se inhala.*

16 **Presentaciones:** **Dosis:**
.450 L .950 L 1 - 1.5 L / ha
5 L

Malation
1000
TRIDENTE



Matagus
34
TRIDENTE



Metralla
MAX



Metrifos
600
TRIDENTE





- I.A:** Deltametrina 2.5% equivalente a 25g de I.A./L
- Cultivos:** Arroz, avena, cebada, frijol, maíz, trigo.
- Formulación y Registro:** Insecticida piretroide
| Concentrado emulsionable | RSCO-INAC-0119-0626-009-2.50
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo por el contacto con la piel, nocivo si se inhala.*
- | | |
|----------------------|--|
| Presentación: | Dosis: |
| 1 L | 30 - 40 cc + 270 cc de agua / ton
100 ml / 10 litros de agua
14 ml / L de diluyente, diesel,
queroseno, agua. |



- I.A:** Benzoato de emamectina 1.79 % equivalente a 19 g/L
- Cultivos:** Maíz.
- Formulación y Registro:** Insecticida perteneciente al grupo de las lactonas macrocíclicas con actividad translaminar.
| Concentrado emulsionable.
RSCO-INAC-0102M-X0269-009-1.79
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala.*
- | | |
|------------------------|------------------|
| Presentaciones: | Dosis: |
| .100 L
1 L | .25 - .30 L / ha |



- I.A:** Tiametoxam 75 % equivalente a 750 g de I.A./Kg
- Cultivos:** Aguacatero, calabacita, calabaza, chayote, chile, cidro, jitomate, lima, limonero, mandarino, melón, naranjo, papa, pepino, pomelo, sandía, tangerino, toronjo, tomate de cáscara.
- Formulación y Registro:** Gránulos dispersables
| Insecticida Agrícola | RSCO-INAC-0102U-X0143-034-075
Categoría toxicológica: 5 PRECAUCIÓN. *Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo por el contacto con la piel, puede ser nocivo si se inhala.*
- | | |
|---|------------------|
| Presentaciones: | Dosis: |
| Exhibidor con 15 sobres de .050 Kg.
200g | 120 - 800 g / ha |



- I.A:** Imidacloprid 1% equivalente a 10g de I.A./Kg
- Cultivos:** Caña de azúcar.
- Formulación y Registro:** Insecticida granulado
RSCO-INAC-0199-0380-005-001
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo por el contacto con la piel, nocivo si se inhala.*
- | | |
|----------------------|---------------|
| Presentación: | Dosis: |
| 20 Kg | 20Kg / ha |



I.A: Cipermetrina 21.5% equivalente a 200g de I.A./L

Cultivos: Frijol, maíz y soya.

Formulación y Registro: Insecticida piretroide. Acaricida agrícola
| Concentrado emulsionable | RSCO-INAC-0111-388-009-022
Categoría toxicológica: 3 PELIGRO. *Tóxico en caso de ingestión.*

Presentaciones: **Dosis:**
.240 L .950 L .3 - .6 L / ha
5 L



I.A: Cipermetrina .3% equivalente a 3g de I.A./Kg

Cultivos: Lima, limón, maíz, mandarina, naranjo, pastizal, toronja, trigo.

Formulación y Registro: Insecticida piretroide | Polvo seco con acción de contacto e ingestión | RSCO-INAC-0111-466-001-0.300
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión. Nocivo por el contacto con la piel. Nocivo si se inhala.*

Presentaciones: **Dosis:**
1 Kg 15 - 20 Kg / ha
20 Kg planta o árbol: 15 -20 g
pastizal: 20 - 35 Kg / ha



18

I.A: Cipermetrina .5% equivalente a 5g de I.A./Kg

Cultivos: Pastizales establecidos en potreros.

Formulación y Registro: Insecticida piretroide | Polvo seco con acción de contacto e ingestión | RSCO-INAC-0111-313-001-001
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo si se inhala*

Presentaciones: **Dosis:**
1 Kg 12 - 15 Kg / ha
20 Kg





I.A: Nitrógeno 29%, Fósforo 5%, Potasio 10%

Cultivos: Pimientos, jitomate, calabacita, pepino, melón, sandía, fresa, papaya, hortalizas de hoja, uva, frutales, ajo, cebolla.

Formulación y Registro: Fertilizante orgánico hidrosoluble de aplicación en fertirriego | Polvo
RSCO-149/XI/11

Presentaciones:

1 kg
20 kg

Dosis:

2 - 6 g / L agua



I.A: Fósforo (P_2O_5) 2%, Potasio 2.50%, Nicotinamida 0.3%, Acido Indol 3 Butírico 0.3%

Cultivos: Ajo, alcachofa, calabacita, cebolla, chile, col, coliflor, fresa, frutales de hoja caduca, frutales tropicales, jitomate, melón, ornamentales leñosas, pepino, pimientos, sandía, uva, viñedos.

Formulación y Registro: Regulador de crecimiento | Líquido.
RSCO-253/X/2012

Presentación:

1 L

Dosis:

Fertirriego: 5 - 10 ml / L agua

Foliar: 10 -15 ml / L agua



I.A: Nitrógeno 8.30%, Fósforo 12.45%, Potasio 4.15%

Cultivos: Alfalfa, aguacate, algodón, arroz, avena, cacahuete, cebada, chícharo, chiles, claveles, coles, crisantemo, durazno, frijol, garbanzo, lechuga, limón, maíz, mandarina, manzano, naranja, nogal, papa, peral, plátano, rosas, soya, tomate, toronja.

Formulación y Registro: Fertilizante foliar. | Líquido con microelementos | RSCO-0084/XI/96

Presentación:

.950 L

Dosis:

2 - 4 L / ha



I.A: Nitrógeno 20.74%, Fósforo 33.10%, Potasio 11.09% y elementos menores.

Cultivos: Algodón, chile, ciruela, limón, mandarina, manzano, melón, naranja, nogal, ornamentales, papa, pepino, peral, sandía, soya, tomate, toronja.

Formulación y Registro: Fertilizante foliar o al suelo sólido.
Polvo | RSCO/0328/XI/98

Presentaciones:

1 Kg
20 Kg

Dosis:

Fertirriego: 10 - 30 g / L

Foliar: 2 - 5 Kg / ha

19

I.A: Ácidos Fúlvicos 27.75% equivalente a <316.4g de I.A./L

Cultivos: Aguacate, arroz, brócoli, calabacita, caña de azúcar, cebada, chile, cítricos, coliflor, frambuesa, fresa, jitomate, maíz, melón, papa, pepino, piña, plátano, rabanito, sandía, tabaco, trigo, zarzamora.

Formulación y Registro: Fertilizante de aplicación foliar y fertirriego | Líquido | RSCO-144/VII/07

Presentaciones: Dosis:
1 L Fertirriego: 4 - 6 L / ha
20 L Foliar: 500 ml / ha



I.A: Nitrógeno 10%, Fósforo 5%, Potasio 35%

Cultivos: Aguacate, calabacita, chile, fresa, jitomates, melón, papaya, pepino, pimientos, sandía.

Formulación y Registro: Fertilizante orgánico hidrosoluble de aplicación foliar y fertirriego | Polvo | RSCO-148/XI/11

Presentaciones: Dosis:
1 Kg Fertirriego: .25 -1.5g / L
20 Kg Foliar: 2 - 3Kg / ha



20

I.A: Fierro* 3%, Boro .22%, Cobre* .184%, Zinc* .384%, Manganeso* 1.4%

Cultivos: Ajo, berenjena, brócoli, calabacita, cebada, cebolla, chile, col, col de bruselas, frutas, jitomate, lechuga, maíz, melon, ornamentales, papa, pepino, sandía, sorgo, tomate, vid.

Formulación y Registro: Fertilizante inorgánico sólido soluble. Foliar y fertirriego | Polvo | RSCO-160/XII/11

Presentación: Dosis:
1 Kg Fertirriego: 2 - 5 kg / ha
Foliar: .5 - 1.5 kg / ha
Ornamentales: 1 - 3 g/planta

Microelementos QUELATADOS



I.A: Nitrógeno 20%, Fósforo 20%, Potasio 20%

Cultivos: Berenjena, calabacita, chile, fresa, frutal, hortaliza de hoja, jitomate, melón, papaya, pepino, pimiento, piña, sandía, zarzamora.

Formulación y Registro: Fertilizante inorgánico sólido soluble | Foliar y fertirriego. | Polvo | RSCO-160/XII/11

Presentación: Dosis:
1 Kg Fertirriego: 2 - 4 g / Kg
Frutales: 4 - 8 kg





I.A: Nitrógeno 20%, Fósforo 20%, Potasio 20%
+ Ácidos fúlvicos 1% y Aminoácidos 1%

Cultivos: Berenjenas, calabacita, chile, fresa, frutales, hortalizas de hoja, jitomates, melón, papaya, pepino, pimientos, piña, sandía, zarzamora.

Formulación y Registro: Fertilizante orgánico granulado de aplicación foliar. | Polvo | RSCO-150/XI/11

Presentación: 1 Kg
Dosis: 1 - 5 kg / ha



I.A: Fósforo 22.07% y Potasio líquido 36.55%

Cultivos: Alfalfa, algodón, berenjena, camote, chile, fresa, frijol, frutales, jitomate, papa, piña, soya, tomate.

Formulación y Registro: Fertilizante foliar | Líquido
RSCO-0225/III/98

Presentaciones: .950 L
5 L
Dosis: .5 - 2 L / ha



I.A: Fósforo 32%, Potasio sólido 53%

Cultivos: Alfalfa, algodón, berenjena, camote, fresa, frijol, frutales, jitomate, papa, piña, soya, tomate, melón, sandía, berries, cebolla.

Formulación y Registro: Fertilizante foliar | Polvo
RSCO-120/IX/11

Presentación: 1 Kg
Dosis: .5 - 3 Kg / ha



I.A: Mezcla de tensoactivos no iónicos, ácidos carboxílicos y sus sales e indicador de pH.

Compatibilidad: Herbicidas, insecticidas y fungicidas.

Formulación y Registro: Bufferizante agrícola. Mezcla de tensoactivos no iónicos

Presentaciones: .240 L
.950 L
Dosis: 1.0-2.0 ml / L

1 I.A: Aminoácidos libres 24.00, Nitrógeno (N) total 6.50, Nitrógeno (N) orgánico 6.00, Fósforo (P2O5) 1.00, Potasio (K2O) 1.00, Materia orgánica total 30.00.

2 **Cultivos:** Hortícolas: Acelga, ajo, apio, betabel, brócoli, calabacita, cebolla, chile, col, coliflor, espárrago, espinaca, jitomate, lechuga, melón, papa, pepino, sandía, zanahoria.
Industriales: Tabaco.
Ornamentales: begonia, clavel, crisantemo, dalia, gladiolo.

3 **Formulación y Registro:** Fertilizante Orgánico | Líquido
RSCO-103/VII/16

4 **Presentación:** 1 L
Dosis:
Foliar: 200-300 mL / 100 L (3-6 L / ha)
Radicular: 10 a 15 L / ha cada 7-15 días



1 I.A: Aminoácidos totales 4.00, Nitrógeno (N) total 1.10, Silicio (SiO2) 8.00, Fósforo total (P2O5) 0.10, Materia orgánica total 1.

2 **Cultivos:** Hortícolas, cereales, cultivos forrajeros, cultivos industriales, frutales, ornamentales.

3 **Formulación y Registro:** Fertilizante Orgánico | Líquido
RSCO-152/XI/14

4 **Presentación:** 1 L
Dosis:
Foliar: 300-500 ml / 100 L de agua.
Fertirrigación: 3.0-8.0 L / ha en cada aplicación.



22

1 I.A: Desinfectante multiusos.

2 **Modo de aplicación:** Aspersión, micronizado o empape; Inmersión de utensilios; Tapetes y fosos sanitarios; Depósitos y líneas de agua en: Desinfección terminal (uso interrumpido); Desinfección continua (en uso); Nebulización en frío o VUB (volumen ultra bajo); Nebulización térmica.

3 **Formulación:** Desinfectante de alto nivel multiusos. | Polvo.
ATENCIÓN. Nocivo en caso de ingestión. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

4 **Presentación:** Cubeta de 5 Kg
Dosis (g por L de agua o vehículo):
5 - 40 g por L de vehículo de 1:2000



1 I.A: Glicerina USP/EP 99.7% min. (KOSHER), Alcoholes e inertes.

2 **Modo de aplicación:** Aspersión, micronizado o empape; Inmersión de utensilios; Tapetes y fosos sanitarios; Depósitos y líneas de agua en: Desinfección terminal (uso interrumpido); Desinfección continua (en uso); Nebulización en frío o VUB (volumen ultra bajo); Nebulización térmica.

3 **Formulación:** Aditivo / Coadyuvante para termonebulizar.

4 **Presentaciones:** 5 L
20 L
Rendimiento:
1 L de TERMO FOG^{MR} cubre aproximadamente de 1,500 a 3,000 m³ dependiendo área a tratar.





I.A: Anticoagulante | Brodifacoum 0.005%equivalente a 0.05g de I.A./Kg

Plagas que controla: Ratas y ratones.

Formulación y Registro: Rodenticida peletizado (de una sola dosis). | RSCO-DOM-RODE-0501-311-057-0.005

Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo por el contacto con la piel.*

Presentaciones:	Dosis:
Cubeta con 50 sobres de 20 g.	1 a 2 sobres de 5 a 10 m / ratas 1 sobre de 2 a 5 m / ratones



I.A: Anticoagulante | Difacinona % 0.005g de I.A./ Kg

Plagas que controla: Ratas y ratones.

Formulación y Registro: Uso doméstico.
Canica: RSCO-DOM-RODE-503-309-057-0.005
EPA Est. No. 1282-WI-01

Uso urbano, barra o bloque parafinado:
RSCO-URB-RODE-503-311-033-0.005
Categoría toxicológica: 4 PRECAUCIÓN.

Nocivo en caso de ingestión.

Presentaciones:	Dosis:
Esferas 1g Barras 14 g y 28 g en tarro 1 Kg y cubeta 8 Kg	Ratas: Infestación media cada 15 m Infestación alta cada 10 m. Ratones: Infestación media cada 20 m Infestación alta cada 10 m.

23



I.A: Alquilfenol 25%

Compatibilidad: Insecticidas, fungicidas, desecantes, nutrientes foliares, herbicidas post-emergentes, herbicidas e insecticidas que tienen acción sistémica.

Formulación y Registro: Coadyuvante-adherente agrícola | Líquido miscible.
ATENCIÓN. *Nocivo en caso de ingestión, nocivo en contacto con la piel, provoca irritación ocular.*

Presentaciones:	Dosis:
240 L .950 L 5 L 20 L	1 - 2 ml / L de agua acción sistémica: 3 - 4 ml / L agua



I.A: Proteína hidrolizada 33% equivalente a 360g de I.A./L a 20°

Plagas: Mosca mexicana de la fruta.

Formulación y Registro: Atrayente agrícola. | Solución acuosa.
ATRA-0702-304-013-033

Categoría toxicológica: 5 PRECAUCIÓN. *Puede ser nocivo en caso de ingestión, puede ser nocivo por el contacto con la piel, puede ser nocivo si se inhala.*

Presentaciones:	Dosis:
.950 L 20 L	Terrestre: 150 - 350 ml de mezcla por árbol Aérea: 1 L de mezcla por ha.

Otros





www.tridente.com.mx

mktridente@tridente.com.mx
atencionaclientes@tridente.com.mx



Agroquímica
Tridente



Tridente
Línea Urbana



Mercadotecnia
Tridente



Agroquímica
Tridente
@tridente



calidad_tridente

Productos • Ubicación de distribuidores Tridente • Apoyo Técnico

Tels. 55 9183 2400 y 55 9183 2406 | LADA 800 20 25 017



Centro de Atención
a Intoxicaciones (ATOX)
LADA 800 000 2869

